



## **RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE COVID 19 EN EMPRESAS Y ORGANISMOS CON ATENCIÓN AL PÚBLICO DURANTE LA CUARENTENA ADMINISTRADA**

Estas recomendaciones buscan prevenir la transmisión de Coronavirus COVID-19 en ámbitos de atención al público, durante la cuarentena administrada.


### **IMPORTANTE:**

- Informar a los trabajadores y proveedores acerca de estas recomendaciones y la importancia de **no acudir al trabajo aunque solo presenten síntomas leves**.
- Todo personal que manifieste síntomas compatibles con COVID-19 durante la jornada laboral debe suspender su tarea y dar aviso a su superior inmediato para instrumentar consulta médica y conducta posterior (aislamiento o cuarentena).
- Contemplar las consecuencias sociales y de salud mental que podría generar un caso de COVID-19 en el lugar de trabajo o en la comunidad, y ofrecer información y apoyo al respecto. En el caso de organizaciones, pequeñas y medianas empresas que carecen de servicios internos de salud y bienestar para el personal, puede ser necesario establecer acuerdos con proveedores locales de servicios sanitarios y sociales.
- **Sólo se permitirá el ingreso de una (1) persona por cada cuatro metros cuadrados (4m<sup>2</sup>), debiendo establecerse las medidas preventivas al respecto. La fila deberá realizarse en el exterior respetando los dos metros (2m) de distancia de persona a persona.**

### **Recomendaciones visuales**

En todo momento es recomendable poner a disposición del público información sobre la adecuada higiene de manos y la apropiada higiene respiratoria o manejo de la tos ante la presencia de síntomas de una infección respiratoria.

Las recomendaciones visuales suelen ser de utilidad como recordatorios en todos los puntos de acceso a las instalaciones. Se sugiere su ubicación en lugares fácilmente visibles para el público general, pasajeros, visitantes.



## Adecuada higiene de manos

Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas:

- Lavado de manos con agua y jabón.
- Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel).


Es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo:

- Antes y después de manipular basura o desperdicios.
- Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.
- Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.
- Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.
- Después de ir al baño o de cambiar pañales.

La higiene de manos puede realizarse con agua y jabón o con alcohol en gel al 70% según disponibilidad.

Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos debe durar, al menos, 15 segundos.





### **Adecuada Higiene Respiratoria**

La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe.

- Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar.
- Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.
- Higienizar las manos después de toser o estornudar.

Las empresas y organismos deben garantizar la disponibilidad de los materiales para facilitar el cumplimiento de una adecuada higiene respiratoria en áreas de espera u alto tránsito:

- Disposición de cestos para el desecho de los pañuelos usados que no requieran de manipulación para su uso: boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto.
- Es recomendable la disposición de dispensadores con soluciones desinfectantes para una adecuada higiene de manos.
- Las soluciones a base de alcohol son el estándar internacional por alta eficiencia demostrada.
- El lavado de manos es una opción igual de efectiva, pero debe garantizarse que los suministros necesarios estén siempre disponibles.
- También se sugiere la colocación de material gráfico que demuestre como debe realizarse la higiene de manos adecuada.

### **Desinfección de superficies y ventilación de ambientes**

La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de transmisión de las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas superficies deben ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por contacto: mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc.

La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, depende del tránsito y de la acumulación de personas, la época del año y la complementación con la ventilación de ambientes.

Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad presente.



### **Limpieza húmeda**

La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc.). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y doble trapo:

- Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso doméstico suficiente para producir espuma.
- Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.
- Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.
- Enjuagar con abundante agua con balde 2 y trapo 2.

### **Desinfección de las superficies**

Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección.

El desinfectante de primera elección es la lavandina, por ser costo efectivo. Con esta solución, pueden desinfectarse las superficies luego de su limpieza. Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos.

El proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con concentración de 55 gr/litro):

- Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua.
- Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las superficies a desinfectar.
- Dejar secar la superficie.

El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para limpieza y desinfección.

### **Ventilación de ambientes**

La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire.

Se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.



### Uso de barbijo "casero"

Todo personal que no pueda mantener una distancia mayor a dos (2) metros con sus compañeros, utilizará un barbijo "casero" durante la jornada laboral. El objetivo es evitar el contagio entre el personal.

### CUIDADOS

- **Lavarse las manos antes y después de colocarse el barbijo.**
- **Evitar tocar el barbijo mientras se usa** (si lo hace lavarse las manos inmediatamente).
- Cambiar el barbijo cuando este húmedo o visiblemente sucio. Lavarlo con agua caliente y detergente de uso diario, si es posible: dejar secar al sol y planchar.
- **No usar el barbijo debajo de la nariz.**
- No usar el barbijo flojo, no dejar espacios a los lados.
- **No dejarlo colocado debajo de la barbilla para descansar de él mientras permanece en el cuello.**
- Para **retirarlo**, hacerlo **desde las tiras, sin tocar la cara externa**, colocarlo inmediatamente en una bolsita y realizar lavado de manos.

### El barbijo medicinal (quirúrgico) solo está recomendado para:

- Personas que presentan síntomas respiratorios detectados.
- Personal de salud que atiende a personas con síntomas respiratorios.

*Estas recomendaciones son dinámicas de acuerdo al avance de la situación actual.*

### Bibliografía:

- <https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendacionesprevencion-empresas-organismos-atencion-publico#4>